

## 氯沙坦钾片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用  
直接作用于肾素-血管紧张素系统的药物可引起正在发育的胎儿损伤和死亡。  
当发现怀孕时，应该尽早停用本品。

### 【药品名称】

通用名称：氯沙坦钾片


英文名称：Losartan Potassium Tablets

汉语拼音：Lushantianjiaonian Pian

【成份】本品主要成分为氯沙坦钾，其化学名称为

[1-(1-基-4-氯-1-[2-(1H-四唑-5-基)-1-甲基]-1H-咪唑-5-甲基]单钾盐。

结构式：



分子式：C<sub>22</sub>H<sub>21</sub>ClKN<sub>6</sub>O

分子量：461.01

【性状】本品为白色的泪珠状薄膜衣片，除去包衣后显白色。

【适应症】

本品主要用于治疗原发性高血压。本品用于对血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂治疗不适用（尤其是有咳嗽或有禁忌症时）的成人慢性心力衰竭，适用于轻度的心室收缩功能不全，并且已接受了慢性心力衰竭的既定治疗方案。对于ACE抑制剂疗效稳定的心力衰竭患者，不建议换用氯沙坦。支持本品有效性的HEAL研究主要包括NYHA心功能分级I级（约6%-70%）-IV级（约30%）的慢性心力衰竭患者。

【规格】50mg

【用法用量】本品可同其他抗高血压药物一起使用。

本品可同或不与食物同时服用。

高血压：对大多数病人，通常起始和维持剂量为每天一次50mg。治疗3至6周可达到最大降压效果。在部分病人中，剂量需要每天一次100mg（早晨服用）。可同进一步的降压作用。

氯沙坦可以与其他抗高血压药合用，尤其是利尿剂（如氢氯噻嗪）（见【禁忌】、【注意事项】和【药物相互作用】）。

对血管容量不足的病人（例如应用大剂量利尿剂治疗的病人），可考虑采用每天一次25mg的起始剂量（见【注意事项】）。

对老年病人或可能损害病人包括透析的病人，不必调整起始剂量。对有肝功能损害病史的病人应考虑使用较低剂量（见【注意事项】）。

心力衰竭：本品用于心力衰竭患者的起始剂量为每天一次12.5mg，通常根据每个病人耐受情况每周为间隔逐渐增加剂量，直至达到该病人可以耐受的最大剂量（12.5mg、25mg、50mg、100mg、或150mg）。最大目标剂量为150mg/天。

【不良反应】临床试验发现本品耐受性良好；不良反应轻微且短暂，一般不能终止治疗。应用本品总的不良反应发生率与安慰剂类似。

在对原发性高血压的临床对照研究中，发生率≥1%，与药物有关、发生率比安慰剂高的唯一不良反应是头痛。另外，不足1%的病人发生与剂量有关的体位性低血压。尽管皮疹在对照试验中的发生率较安慰剂低，但也有个别报导。

在这些原发性高血压的临床双盲对照研究中，应用本品后，不论是否与药物有关，发生率在1%及以上的不良反应有：

	氯沙坦钾片 (n=2085)	安慰剂 (n=535)
全身		
腹痛	1.7	1.7
乏力/疲劳	3.8	3.9
胸痛	1.1	2.6
水肿/肿胀	1.7	1.9
心血管系统		
心悸	1.0	0.4
心动过速	1.0	1.7
消化系统		
腹泻	1.9	1.9
消化不良	1.1	1.5
恶心	1.8	2.8
肌肉骨骼系统		
背痛	1.6	1.1
肌肉痉挛	1.0	1.1
神经/精神系统		
头晕	4.1	2.4
头痛	14.1	17.2
失眠	1.1	0.7
呼吸系统		
咳嗽	3.1	2.6
鼻充血	1.3	1.1
咽炎	1.5	2.6
鼻窦疾病	1.0	1.3
上呼吸道感染	6.5	5.6

【禁忌】对本品任何成分过敏者禁用。在糖尿病或蛋白尿患者中，禁用氯沙坦。

【注意事项】本品不可用于治疗原发性高血压。当发现怀孕时，应该尽早停用本品。

【孕妇及哺乳期妇女用药】不建议在妊娠前3个月中使用氯沙坦。妊娠中晚期不应用氯沙坦。

【孕妇用药】本品作用于肾素-血管紧张素系统的药物可能引起正在发育的胎儿损伤和死亡。当发现怀孕时，应该尽早停用本品。

【哺乳期妇女用药】尚不知本品是否能通过乳汁分泌。哺乳期妇女慎用本品。

【儿童用药】尚未进行动物研究证明氯沙坦对儿童的损伤和死亡。当发现怀孕时，应该尽早停用本品。

【老年用药】尚未进行动物研究证明氯沙坦对老年人的损伤和死亡。当发现怀孕时，应该尽早停用本品。

【药物相互作用】本品与ACE抑制剂、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂或阿利吉仑达到双重阻断RAAS（见【药物相互作用】）。

如果认为双重阻断治疗确实必要，则只应在专家指导下并进行紧密监测肾功能、电解质和血压。在糖尿病肾病患者中不应联合使用ACE-抑制剂和血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂。

其它警觉和预防措施：正如血管紧张素转换酶抑制剂所观察到的，氯沙坦和其他血管紧张素受体拮抗剂在老人中的降压效果明显低于非老人，这可能是因为老人肾功能差。

主动脉瓣二尖瓣狭窄、梗阻性肥厚型心肌病 如同其它血管扩张剂，在患有主动脉狭窄或二尖瓣狭窄或梗阻性肥厚型心肌病患者中，特别要注意。

【贮藏】 药形盒装。避免儿童接触。

【有效期】 36个月。铝塑包装。铝塑包装。

【执行标准】 YB1603-932022

【批准文号】 国药准字H20223111

【生产企业】 上海新黄浦制药有限公司

【产品名称】 氯沙坦钾片

【产品批准文号】 国药准字H20223111

【产品名称】 氯沙坦钾片</p